


Prévenir Ebola grâce au dépistage des voyageurs



Afrique de l'Ouest

Dépistage au DÉPART

Tous les voyageurs au départ de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone sont soumis à un dépistage avant de monter à bord des avions.

- Risque d'exposition élevé
- Risque d'exposition modéré sans équipement de protection individuelle



Voyage NON AUTORISÉ

- Risque d'exposition modéré avec équipement de protection individuelle
- Risque d'exposition faible
- Signes ou symptômes d'Ebola



Voyage NON AUTORISÉ

- Risque d'exposition modéré avec équipement de protection individuelle
- Risque d'exposition faible
- Absence de signes ou symptômes d'Ebola



Voyage AUTORISÉ

États-Unis

Dépistage à l'ARRIVÉE

Tous les voyageurs débarquant aux États-Unis en provenance de Guinée sont soumis à un dépistage à leur arrivée.

- Signes ou symptômes d'Ebola



Évaluation médicale

- Risque d'exposition élevé
- Risque d'exposition modéré sans équipement de protection individuelle



Voyage NON AUTORISÉ

Surveillance des symptômes durant 21 jours en collaboration avec les services de santé

- Risque d'exposition modéré avec équipement de protection individuelle
- Risque d'exposition faible
- Absence de signes ou symptômes d'Ebola



Voyage AUTORISÉ

Les voyageurs en provenance de Sierra Leone, du Libéria ou de Guinée surveillent l'apparition éventuelle de symptômes d'Ebola pendant 21 jours et contactent les services de santé s'ils tombent malades.

Pour plus d'informations sur le dépistage et la surveillance des voyageurs, voir le site : www.cdc.gov/vhf/ebola/travelers/ebola-screening-factsheet.html.

Définitions des niveaux de risque d'exposition (élevé, modéré et faible) disponibles sur : <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/exposure/risk-factors-when-evaluating-person-for-exposure.html>.

